

# HP-41C Guida rapida pacco di statistica

| Denominazione del programma   | Inizializzazione   | Dati  | Correzioni  | Risultati  | Ri-Inizializzazione |
|---|--|---|---|--|---------------------|
| Statistica base per due variabili<br>(SIZE: 012)                        | <b>XEQ</b><br><b>ΣBSTAT</b><br><b>XEQ</b><br><b>ΣBSTG</b>  | $x_i \text{ [ENTER+]} y_i \text{ [A]}$<br>$x_i \text{ [ENTER+]} y_i \text{ [ENTER+]} f_i \text{ [A]}$   | $x_k \text{ [ENTER+]} y_k \text{ [C]}$<br>$x_k \text{ [ENTER+]} y_k \text{ [ENTER+]} f_k \text{ [C]}$   | <b>E</b> , <b>R/S</b> , ...  |                     |
| Momento, deviazione e Kurtosi<br>(SIZE: 012)                            | <b>XEQ</b><br><b>ΣMMTUG</b><br><b>XEQ</b><br><b>ΣMMTGD</b>   | $x_i \text{ [A]}$<br>$y_j \text{ [ENTER+]} f_j \text{ [A]}$   | $x_k \text{ [C]}$<br>$y_k \text{ [ENTER+]} f_k \text{ [C]}$   | <b>E</b> , <b>R/S</b> , <b>R/S</b> , <b>R/S</b> ,<br><b>R/S</b> , <b>R/S</b>   |                     |
| Analisi della varianza<br>(a una via) (SIZE: 020)                       | <b>XEQ</b><br><b>ΣAOVONE</b>   | $x_{ij} \text{ [A]}, \text{ [R/S]}, \text{ [R/S]}, \text{ [R/S]}$   | $x_{im} \text{ [C]}$  | <b>E</b> , <b>R/S</b> , ...  |                     |
| Analisi della varianza<br>(a due vie, senza ripetizioni)<br>(SIZE: 018) | <b>XEQ</b><br><b>ΣAOVTWO</b>   | Row-wise: $x_{ij} \text{ [A]}, \text{ [R/S]}, \text{ [R/S]}$<br>Column-wise: $x_{ij} \text{ [A]}, \text{ [R/S]}$                                | $x_{im} \text{ [C]}$<br>$x_{kj} \text{ [C]}$  | <b>E</b> , <b>R/S</b> , ...  |                     |
| Analisi della covarianza<br>(a una via)<br>(SIZE: 026)                  | <b>XEQ</b><br><b>ΣANOCOV</b>   | $x_{ij} \text{ [ENTER+]} y_{ij} \text{ [A]}, \text{ [R/S]}, \text{ [R/S]}, \text{ [R/S]}$   | $x_{im} \text{ [ENTER+]} y_{im} \text{ [C]}$  | <b>E</b> , <b>R/S</b> , ...  |                     |
| Regressioni<br>(SIZE: 016)  | <b>XEQ</b><br><b>ΣLIN</b><br><b>XEQ</b><br><b>ΣEXP</b><br><b>XEQ</b><br><b>ΣLOG</b><br><b>XEQ</b><br><b>ΣPOW</b> | $x_i \text{ [ENTER+]} y_i \text{ [A]}$  | $x_k \text{ [ENTER+]} y_k \text{ [C]}$  | <b>E</b> , <b>R/S</b> , <b>R/S</b> , $x \text{ [R/S}] \rightarrow \hat{y}$   |                     |
| Regressione lineare multipla<br>(SIZE: 015)                             | <b>XEQ</b><br><b>ΣMLRXY</b><br><b>XEQ</b><br><b>ΣMLRXYZ</b>  | $x_i \text{ [ENTER+]} y_i \text{ [ENTER+]} t_i \text{ [A]}$<br>$x_i \text{ [ENTER+]} y_i \text{ [ENTER+]} z_i \text{ [ENTER+]} t_i \text{ [A]}$ | $x_k \text{ [ENTER+]} y_k \text{ [ENTER+]} t_k \text{ [C]}$<br>$x_k \text{ [ENTER+]} y_k \text{ [ENTER+]} z_k \text{ [ENTER+]} t_k \text{ [C]}$ | <b>E</b> , <b>R/S</b> , <b>R/S</b> , <b>R/S</b> ,<br>$x \text{ [ENTER+]} y \text{ [R/S}] \rightarrow \hat{t}$<br><b>E</b> , <b>R/S</b> , <b>R/S</b> , <b>R/S</b> ,<br><b>R/S</b> , $x \text{ [ENTER+]} y \text{ [ENTER+]} z \text{ [R/S}] \rightarrow \hat{t}$ |                     |

| Denominazione del programma                          | Inizializzazione  | Dati  | Correzioni  | Risultati   | Ri-Inizializzazione   |
|--|---|---|---|---|-----------------------|
| Regressione polinomiale (SIZE: 045)                  | <b>XEQ</b><br><b>ΣPOLYP</b><br><b>XEQ</b><br><b>ΣPOLYC</b>  | $x_i \text{ [ENTER]} y_i \text{ [A]}$   | $x_k \text{ [ENTER]} y_k \text{ [C]}$   | <b>E</b> , <b>R/S</b> , <b>R/S</b> , <b>R/S</b><br>$x \text{ [R/S]} \rightarrow \hat{y}$  | <b>■</b> $\text{[A]}$ |
| Test statistici (SIZE: 015)                          | <b>XEQ</b><br><b>ΣPTST</b><br><b>XEQ</b><br><b>ΣTSTAT</b>   | $x_i \text{ [ENTER]} y_i \text{ [A]}$<br><br>$x_i \text{ [A]} . \text{ [R/S]}$<br>$y_i \text{ [A]}$                   | $x_k \text{ [ENTER]} y_k \text{ [C]}$<br><br>$x_k \text{ [C]}$<br>$y_k \text{ [C]}$                                   | <b>E</b> , <b>R/S</b> , <b>R/S</b> , <b>R/S</b><br><br>$d \text{ [E]} , \text{ [R/S]}$  | <b>■</b> $\text{[A]}$ |
| Valutazione di Chi-quadrato (SIZE: 008)              | <b>XEQ</b><br><b>ΣXSQEV</b><br><b>XEQ</b><br><b>ΣEEFXSQ</b> | $O_i \text{ [ENTER]} E_i \text{ [A]}$<br><br>$O_i \text{ [A]}$  | $O_k \text{ [ENTER]} E_k \text{ [C]}$<br><br>$O_h \text{ [C]}$  | <b>E</b><br><br><b>E</b> , <b>R/S</b>   | <b>■</b> $\text{[A]}$ |
| Tavola della contingenza (SIZE: 015)                 | <b>XEQ</b><br><b>ΣCTKK</b><br><b>XEQ</b><br><b>ΣCTKKK</b>   | $x_{1j} \text{ [ENTER]} x_{2j} \text{ [A]}$<br><br>$x_{1j} \text{ [ENTER]} x_{2j} \text{ [ENTER]} x_{3j} \text{ [A]}$ | $x_{1k} \text{ [ENTER]} x_{2k} \text{ [C]}$<br><br>$x_{1h} \text{ [ENTER]} x_{2h} \text{ [ENTER]} x_{3h} \text{ [C]}$ | <b>E</b> , <b>R/S</b> , <b>R/S</b> , <b>R/S</b> , <b>R/S</b> , <b>R/S</b><br><br>$x \text{ [C]} \rightarrow f(x)$<br>$x \text{ [E]} \rightarrow Q(x)$ | <b>■</b> $\text{[A]}$ |
| Coefficiente di correlazione di Spearman (SIZE: 003) | <b>XEQ</b><br><b>ΣSPEAR</b>                                 | $R_i \text{ [ENTER]} S_i \text{ [A]}$   | $R_k \text{ [ENTER]} S_k \text{ [C]}$   | <b>E</b> , <b>R/S</b>   | <b>■</b> $\text{[A]}$ |
| Distribuzione normale e normale inversa (SIZE: 019)  | <b>XEQ</b><br><b>ΣNORMD</b>                                 | —   | —   | $Q(x) \text{ [A]} \rightarrow x$<br>$x \text{ [C]} \rightarrow f(x)$<br>$x \text{ [E]} \rightarrow Q(x)$  | —                     |
| Distribuzione Chi-quadrato (SIZE: 007)               | <b>XEQ</b><br><b>ΣCHISQD</b>                                | $\nu \text{ [A]}$   | —   | $x \text{ [C]} \rightarrow f(x)$<br>$x \text{ [E]} \rightarrow P(x)$  | —                     |



00041-90064